

RENDIMIENTO APROXIMADO EN m²			
PREPARACION	SECO	PINTURA	ASPERSIÓN
250 gramos	125	143	143
500 gramos	250	286	286
750 gramos	375	429	429
1,00 Kg	500	572	572
1,25 Kg	625	715	715
1,50 Kg	750	858	858
2,00 Kg	1000	1144	1144

Frecuencia de aplicación: repetir la aplicación cada 3 semanas, o cuando las moscas hayan consumido el producto.

Seguridad y buenas prácticas de manejo

Antes de comenzar la aplicación de Mosca Finn® lea atentamente las instrucciones del rótulo.

Fórmula

Imidacloprid, 0,500 g;
Benzoato de denatonium (Birtax), 0,001g
Ultralure (Z-9 tricosene), 0,125 g
y excipientes c.s.p., 100 g.

Presentación

Envase conteniendo 750 g.



CLASIFICACION TOXICOLOGICA:

Clase IV; Banda verde;
Productos que normalmente no ofrecen peligro.

Toxicidad aguda:

DL 50 oral rata 2500mg/Kg.;
DL 50 dérmica 2000mg/Kg.;
Irritación dérmica en conejo: No irritante;
Sensibilizante en cobayo: No sensibilizante.

Insecticida Mata Moscas

Mosca FINN®



Imidacloprid + Ultralure

PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA Y/O ESTUCHE.

Mosca FINN®

La mosca como plaga

La mosca es un insecto transmisor de enfermedades que afecta a personas y animales, ocasionando graves daños económicos en zonas rurales y urbanas.



La mosca doméstica (musca doméstica) se comporta como vector de agentes infecciosos actuando de esta

manera como propagadora de diversas enfermedades, como cólera, conjuntivitis, tuberculosis, poliomielitis, disentería, hepatitis y además producen gusaneras en el ganado y en el hombre.

Esta plaga daña la salud de la población y afecta la producción agroindustrial.

Fórmula innovadora

El Mosca Finn® cebo está formulado en base a tres componentes: Imidacloprid, Birtax y Ultralure, que aseguran su eficacia y seguridad.

1. IMIDACLOPRID:

Se une al receptor nicotínico en la región post-sináptica

del sistema parasimpático, impidiendo la unión del neurotransmisor acetilcolina con su consiguiente acumulación que lleva a la parálisis muscular del insecto. Los receptores nicotínicos son mucho más abundantes en los insectos que en los animales de sangre caliente lo que determina su toxicidad selectiva para los primeros. El Imidacloprid tiene acción por contacto y por ingestión, siendo el responsable del poder de volteo de la formulación.

2. BIRTAX:

Benzoato de denatonium: amargante, preventivo de la ingestión humana.

3. ULTRALURE:

Es la hormona Z9 Tricosene que actúa como potente atrayente.

Técnicas de uso

El insecticida mata moscas Mosca Finn® controla en forma eficaz y rápida a moscas adultas.

Puede ser aplicado en forma seca (cebo granulado) o en forma líquida como pintura o por aspersión. Esto facilita su aplicación en cualquier superficie.

Se utiliza en granjas, frigoríficos, establecimientos industriales, tambos, criaderos de cerdo, caballerizas, galpo-

nes de pollos, galpones de ponedoras y casas.

En locales de elaboración de productos comestibles se utilizará exclusivamente en exteriores. En depósitos de productos comestibles se utilizará cuando se hallen vacíos.

ACCION EFICAZ

Su fácil aplicación sobre cualquier superficie sumado al efectivo poder de volteo del Imidacloprid hacen de Mosca FINN la solución eficaz para el control de moscas adultas.

1



La mosca es atraída hacia el cebo por la acción de la hormona Z-9 Tricosene

2



El Imidacloprid actúa por contacto e ingestión. La mosca muere a los pocos minutos.

Insecticida mata moscas de fácil aplicación y acción eficaz

USO AGRO-INDUSTRIAL


De utilización en establecimientos rurales e industriales



TAMBOS



GALPONES DE AVES



CANILES



CRIADEROS DE CERDOS



CABALLERIZAS



FRIGORIFICOS Y SEBERIAS

En locales de elaboración de productos comestibles: se utilizará exclusivamente en exteriores. En depósitos de comestibles se utilizará cuando se hallen vacíos.

MODOS DE APLICACIÓN

FORMA SECA

■ Cebo granulado:



Aplicar en los lugares preferidos por las moscas. Colocar en recipientes

poco profundos 2 (dos) gramos por mada m². Pueden utilizarse también bandejas o recipientes planos para facilitar la acumulación de moscas muertas. Retirar las moscas muertas y agregar nuevamente granulado. Humedecer con leves pulverizaciones de agua el cebo granulado para activar el producto.

FORMA LÍQUIDA

■ Pintura:



1kg cebo + 800 cc agua

Mezclar 1 parte de cebo en 0,8 partes de agua corriente (1 kg en 800 cc). Agitar durante 15 minutos hasta lograr una mezcla consistente. Aplicar con pincel, 2-3 pinceladas ininterrumpidas de la preparación en las superficies seleccionadas (pared, vigas, instalaciones, etc.). Dibujar franjas horizontales de 30 cm.

■ Aspersión:



1 CEBOS + 1 AGUA

Mezclar 1 parte de cebo en 1 parte de agua corriente (1 kg en 1 litro). Agitar durante por lo menos 15 minutos, hasta formar una suspensión homogénea. Aplicar con aspersor de gota mediana.